

Колк

MD-HIP

СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ

1

Анатомски знак:

8 см над надворешниот кондил на фемурот

MD:
MD-Muscle

Вбрзгување:
i.m. до длабочина од 1 см,
воведете ја иглата под агол од
90 степени на површината на
кожата
- Алтернативно: s.c.



Напомена:

Сите субкутани (s.c.) вбрзгувања мора да се изведат со игла со должина 12-16 mm, пречник 25-28 G.

Сите интрамускулни (i.m.), вбрзгувања мора да се изведат со игла со должина 40 mm, пречник 21 G.

Интреартикуларно вбрзгување (i.a.) мора да се направи со наменска игла.

- При субкутано вбрзгување, внесете ја иглата под агол од приближно 45 степени ($\angle 45$);
- При интрамускулно вбрзгување, внесете ја иглата под агол од приближно 90 степени ($\angle 90$).

КОЛК - MD-HIP

ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ СРЕДСТВА MD

- Инјектирајте во главните точки

- Остеоартритис на зглобот на колкот: **MD Hip**
- Воспаление на зглобната капсула на колкот: **MD Hip + MD Matrix**
- Остеоартритис на зглобот на колкот со реуматоиден артритис: **MD Hip + MD Poly**
- Болка во зглобот на колкот од мускулно потекло: **MD Hip + MD Muscle + MD Neural**

- Болка во зглобот на колкот од нервно потекло (болка која пучи во колкот): **MD Hip + MD Neural**
- Болка во зглобот на колкот после долготрајно лежење: **MD Hip + MD Matrix + MD Tissue**.