

Ишијадичен нерв

MD-ISCHIAL

● СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:

- A) На средина на предниот дел на бутот околу 20 см над горната ивица на пателата
B) На средина на предниот дел на бутот околу 15 см над горната ивица на пателата.


MD:
MD Neural + MD Matrix

Вбризгување:
i.m. или s.c.

- C) Пациентот стои право, на бочната површина на бутот, во точката каде што средниот прст на пациентот го допира бутот

MD:
MD Neural + MD Matrix

Вбризгување:
s.c.



● ГЛАВНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:

- A) Средина на големиот седален мускул, 5-6 см латерално од постериорната средишна линија
B) Средина на глутеално-феморален набор
C) Средина на задната површина на бутот, на средина помеѓу анатомскиот знак B (види горе) и анатомскиот знак D (види горе)
D) Средина на поллитеалната бразда
E) Точка на инсерција помеѓу двата мускули на гастрокнемиус и тетивата на soleus
F) 3-4 см од врвот на долниот постериорен надворешен малеолус.

Вбризгување:

- A, B, и C: i.m.
D: i.d.
E, F: s.c.



Напомена:

Сите субкутани (s.c.) и интрадермални (i.d.) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина 12-16 мм, пречник 25-28 G.

Сите интрамускулни (i.m.) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина 40 мм, пречник 21 G

- При субкутано вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 степени ($\angle^{gh}$);
- * При интрадермално вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 30 степени ($\angle^{ea}$);
- При интрамускулно вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 90 степени ($\angle^{la}$).

Ишијадичен нерв - MD ISCHIAL

ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ MD

- Инјектирајте во **главните точки**

- Ишијалгична болка: **MD ISCHIAL**
- Лумбално-ишијална болка: **MD ISCHIAL + MD LUMBAR + MD NEURAL**
- Невралгија во долниот дел на лумбалниот рбет: **MD ISCHIAL + MD MUSCLE**

- Перзистентна ишијална болка заради постоперативен третман на дискус хернија на L4-L5, L5-S1: **MD ISCHIAL + MD NEURAL**
- Мортонев неуром: **MD ISCHIAL + MD NEURAL + MD TISSUE**